

## Lógica proposicional

1. Quais das seguintes frases são proposições?
  - (a) Isto é verdade?
  - (b) João é um nome.
  - (c) 8 é um número ímpar.
  - (d) 8 é um número par.
  - (e) Esta cor é bonita.
2. Indique os valores lógicos das proposições seguintes:
  - (a) 7 é um número primo.
  - (b) Lisboa é uma cidade.
  - (c) Portugal é uma cidade.
3. Indique quais das seguintes proposições são atómicas e quais são compostas.
  - (a) O Frederico é alto, e o Joaquim também.
  - (b) O carro acidentado era azul ou verde.
  - (c) O carro acidentado era meu.
  - (d) Se fores ao bar, então eu vou ao bar.
4. Usando os símbolos  $r$  e  $f$  para “Manuel é rico” e “Manuel é feliz”, respectivamente, escreva as seguintes afirmações na forma simbólica.
  - (a) Manuel é rico.
  - (b) Manuel é rico e feliz.
  - (c) Manuel é rico ou feliz.
  - (d) Se Manuel é rico, então é feliz.
5. Identifique todas as proposições atómicas nas frases seguintes e represente-as por símbolos  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , etc. Em seguida escreva as frases sob a forma de cálculo proposicional.
  - (a) Se a Maria está no ginásio, então a Marta também está no ginásio.
  - (b) O carro do Rui é vermelho ou castanho.
  - (c) Se te levatares às sete horas, chegarás a tempo.
  - (d) Chegarás a tempo se e só se te levatares às sete horas.
  - (e) Ele virá se tu o avisares.
  - (f) É suficiente que o João tenha 9,5 valores para que passe.

- (g) Amanhã vou de autocarro ou de táxi.
- (h) Amanhã vou de autocarro se ele parar no Rossio, ou vou de táxi se tiver dinheiro.
- (i) Se acabar o meu trabalho então vou para a praia caso faça bom tempo.
6. Use os símbolos proposicionais  $p$  e  $q$  para formalizar os seguintes argumentos lógicos:
- (a) Se 10 é um número primo, 10 não pode ser igual a 2 vezes 5. 10 é igual a 2 vezes 5. Logo, 10 não pode ser um número primo.
- (b) Se chove frequentemente, os agricultores queixam-se. Se não chove frequentemente, os agricultores queixam-se. Consequentemente, os agricultores queixam-se.
- (c) O António almoça na cantina ou o António almoça em casa. O António não almoça na cantina. Logo, o António almoça em casa.
7. Escreva cada uma das seguintes afirmações na forma “se  $p$  então  $q$ ”.
- (a) Chove sempre que o vento sopra de Sul.
- (b) É necessário caminhar 20 quilómetros para chegar ao topo do Everest.
- (c) Toca nesse bolo e arrepende-te-ás.
- (d) As rosas florirão se estiver calor durante uma semana.
- (e) A garantia está activa só se tiveres comprado o computador há menos de um ano.
- (f) Para teres 20 nesta disciplina, é necessário que aprendas a resolver problemas de matemática discreta.
- (g) Para ser aprovado na disciplina, é suficiente obter 10 valores no exame.
8. Coloque parênteses nas expressões seguintes de tal modo que sejam indicadas as regras de prioridade estabelecidas para os conectivos envolvidos.
- (a)  $p \wedge q \wedge r \rightarrow p$ .
- (b)  $p \wedge r \vee q \rightarrow \neg r$ .
- (c)  $\neg(p_1 \wedge p_2) \rightarrow \neg q \vee p_1$ .
- (d)  $p \rightarrow q \rightarrow \neg q \rightarrow \neg q$ .
9. Escreva as tabelas de verdade para:
- (a)  $\neg(\neg p \vee \neg q)$ .
- (b)  $(\neg p \wedge (\neg q \wedge r)) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge r)$ .
- (c)  $(p \vee (q \wedge r)) \vee \neg((p \vee q) \wedge (r \vee s))$ .
- (d)  $(p \rightarrow \neg q) \wedge (q \rightarrow p)$ .
- (e)  $((p \rightarrow q) \rightarrow q) \vee \neg p$ .
10. O conectivo lógico conhecido por “ou exclusivo”, e denotado por  $\dot{\vee}$ , é definido pela tabela de verdade

$p$	$q$	$p \dot{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- (a) Mostre que  $\dot{\vee}$  é equivalente a  $\neg(p \leftrightarrow q)$ .
- (b) Construa a tabela de verdade para  $(p \dot{\vee} q) \dot{\vee} r$ .
11. Determine valores de verdade para as variáveis proposicionais  $p$ ,  $q$  e  $r$  para os quais o valor de verdade da fbf  $(p \vee q \rightarrow r) \wedge p \rightarrow (r \rightarrow q)$  seja falso.
12. Qual é o valor de verdade das seguintes proposições?
- (a) O número 2 é primo ou 4 é ímpar.
- (b) O número 2 não é primo e 4 é ímpar.
- (c) O número 2 é primo e 4 é ímpar.
- (d) O número 2 não é primo ou 4 é ímpar.
- (e) Se 2 não for primo então 4 é ímpar.
- (f) Se 2 não for primo então 4 é par.
- (g) Se 2 não for primo e 4 for par então  $4 < 2$ .
13. Diga quais das seguintes fórmulas são tautologias, contradições, ou contingências.
- (a)  $((p \rightarrow q) \rightarrow \neg(q \rightarrow p)) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$ .
- (b)  $((p \rightarrow q) \rightarrow q) \rightarrow q$ .
- (c)  $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \leftrightarrow (q \rightarrow (q \rightarrow p))$ .
- (d)  $(p \rightarrow (q \wedge \neg q)) \rightarrow \neg p$ .
14. Simplifique as expressões seguintes:
- (a)  $(p \wedge \mathbf{V}) \wedge (q \wedge \mathbf{V})$ .
- (b)  $(r \wedge \mathbf{V}) \wedge (q \wedge \neg r)$ .
- (c)  $p \vee \neg q \vee (p \wedge q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge \neg p \wedge q$ .
15. Escreva a negação das proposições (a), (b), (c) e (i) do Exercício 5.
16. Prove que  $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r)$  e  $q \rightarrow (p \vee r)$  são logicamente equivalentes,
- (a) usando uma tabela de verdade;
- (b) usando equivalências lógicas conhecidas.
17. Use a tabela das equivalências básicas para provar que:
- (a)  $\neg((\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q))$  é equivalente a  $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$ .
- (b)  $\neg q \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow \neg p$  é uma tautologia.

18. Demonstre a utilidade do método de Quine na averiguação se a fbf seguinte é uma tautologia, contradição ou contingência:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \vee r \rightarrow q \vee r).$$

19. Mostre que a fórmula  $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$  não é uma tautologia. Encontre fórmulas  $\phi$  e  $\psi$  tais que  $(\neg \phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\phi \rightarrow \neg \psi)$  seja uma contradição.

20. Determine expressões logicamente equivalentes às seguintes mas sem os conectivos  $\rightarrow$  e  $\leftrightarrow$ :

(a)  $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r)$ .

(b)  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge q \leftrightarrow q)$ .

(c)  $\neg p \rightarrow \neg q$ .

21. Verifique se o argumento seguinte está correcto (isto é, se a conclusão é logicamente implicada pela conjunção das hipóteses).

*Se o orçamento não for cortado, uma condição necessária e suficiente para os preços permanecerem estáveis é que os impostos sejam aumentados. Os impostos serão aumentados somente se o orçamento não for cortado. Se os preços permanecerem estáveis, os impostos não serão aumentados. Portanto os impostos não serão aumentados.*

22. Decida se  $p \vee \neg s$  é consequência tautológica das premissas  $p \vee \neg q$ ,  $q \vee r$  e  $r \vee s$ .

23. Encontre uma fórmula restrita (isto é, contendo apenas os conectivos  $\neg$ ,  $\wedge$  e  $\vee$ ) correspondente à função de verdade  $f(p, q, r)$  dada pela tabela

$p$	$q$	$r$	$f(p, q, r)$
V	V	V	V
F	V	V	F
V	F	V	F
F	F	V	F
V	V	F	F
F	V	F	F
V	F	F	V
F	F	F	F

24. Seja  $f$  a função lógica dada pela tabela

$p$	$q$	$r$	$f(p, q, r)$
F	F	F	F
F	F	V	V
F	V	F	F
F	V	V	F
V	F	F	V
V	F	V	F
V	V	F	F
V	V	V	V

- (a) Determine a forma normal disjuntiva de  $f$ .

- (b) Determine a forma normal conjuntiva de  $f$ .
25. Mostre que cada um dos seguintes conjuntos de conectivos é completo para o cálculo proposicional:
- $\{\neg, \rightarrow\}$ .
  - $\{\neg, \wedge\}$ .
  - $\{\neg, \vee\}$ .

26. Prove as regras de inferência seguintes, usando tabelas de verdade.

- Modus ponens.
- $a \rightarrow b, \neg a \rightarrow b \models b$ .

27. Mostre que  $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \rightarrow q$  é uma tautologia e use esta tautologia para provar que

$$\neg p \rightarrow \neg q, \neg \neg p \rightarrow \neg q \models \neg q.$$

28. Mostre que os seguintes argumentos são correctos, usando tabelas de verdade.

- $p \vee q, \neg p \vee r \models q \vee r$ .
- $p \rightarrow q, p \rightarrow r \models p \rightarrow q \wedge r$ .
- $p, p \rightarrow q \models p \wedge q$ .
- $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r \models r$ .

29. Averigue se os seguintes argumentos são válidos, indicando, para cada argumento válido, a regra de inferência que é usada.

- O número  $\log_2 3$  é irracional se não for igual à razão de dois inteiros. Por conseguinte, como  $\log_2 3$  não é igual à razão de dois inteiros, conclui-se que  $\log_2 3$  é irracional.
- Se  $n$  é um número real tal que  $n > 1$ , então  $n^2 > 1$ . Suponhamos que  $n^2 > 1$ . Então  $n > 1$ .
- Se  $n$  é um número real tal que  $n > 3$ , então  $n^2 > 9$ . Suponhamos que  $n^2 \leq 9$ . Então  $n \leq 3$ .
- A função  $f$  tem derivada nula no ponto  $a$  ou não tem derivada em  $a$ . Como  $f$  tem derivada em  $a$ , conclui-se que  $f'(a) = 0$ .
- Se durmo menos do que 7 horas por dia então trabalho muito. Se trabalho muito e durmo menos do que 7 horas por dia então estou cansado. Eu não estou cansado. Logo eu não trabalho muito.
- O resto da divisão de um número par por 4 é 0 ou 2. Assim, se o resto da divisão de um número par por 4 não é 0, então é 2.
- Se  $n$  é um número primo então é ímpar ou igual a 2. Logo, se  $n$  é um número par diferente de 2, concluímos que  $n$  não é primo.

30.  $A$ ,  $B$  e  $C$  compareceram perante um tribunal, acusados de roubo. Conseguiu-se estabelecer que:

- Se  $A$  não é culpado, o culpado é  $B$  ou  $C$ .
- Se  $A$  não é culpado então  $C$  não é culpado.
- Se  $B$  é culpado então  $A$  é culpado.

Será possível decidir sobre a culpabilidade de  $A$  a partir destes factos? Se sim, determine se  $A$  é ou não culpado.