

Elementos de Topologia
Exame Modelo 1B - 2002/2003

Duração: 2h 30m

1) Para cada um dos seguintes subconjuntos de \mathbb{R} , indique quais são abertos e quais são fechados:

a) \mathbb{Q} b) $\bigcap_{n=1}^{\infty} \left] -\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right[$ c) $\{1,3,5\}$ d) $\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$

2) Seja (Y, τ) um espaço topológico qualquer. Seja $X \subset Y$ e seja X denso em Y . Prove que $\text{int}(Y \setminus X) = \emptyset$.

3) Dê um exemplo de uma família de intervalos abertos centrados nos racionais do intervalo $[a,b]$, mas que não constitua uma cobertura aberta de $[a,b]$.

4) a) Mostre que os conjuntos $[a,b]$ e $]c,d[$ são conexos;

b) Dê exemplo de um subconjunto de \mathbb{R} desconexo;

c) Mostre que os intervalos $[a,b]$ e $]c,d[$ não são homeomorfos, usando a noção de conjunto conexo.

5) Seja $(B_x)_{x \in X}$ uma família de sistemas fundamentais de vizinhanças do espaço topológico (X, τ) . Prove que se A é um subconjunto de X então

$$\text{int}(A) = \left\{ x \in X \mid (\exists B \in B_x) B \subset A \right\}$$

6) Dos conjuntos seguintes indique quais são conexos e quais são conexos por arcos:

a) $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 1$

b) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq x^2 + y^2 < 4\}$

7) Prove que uma função contínua não é necessariamente aberta.

8) Prove que $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ é contínua se e somente se para todo o fechado F em τ' se tem que $f^{-1}(F)$ é fechado em (X, τ) .

9) Prove que todo o subespaço fechado de um conjunto compacto é compacto.

10) Aplicando o Teorema do Ponto de Fixo de Banach, prove que a equação $\sqrt{2+\sqrt{x}} = x$ tem uma e uma só solução em $[1, +\infty[$.