


DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA  
TRATAMENTO MATEMÁTICO DAS OBSERVAÇÕES

ANO DE 2000/01


FOLHA 6

1. Usando interpolação de Lagrange global de grau 5, determine aproximações para as seguintes curvas paramétricas:


(a)  $\begin{cases} x = (1 + \cos(2\pi t)) \cos(2\pi t) \\ y = (1 + \cos(2\pi t)) \sin(2\pi t) \end{cases}, t \in [0, 1];$



(b)  $\begin{cases} x = \sqrt{\cos(\pi(t - 0.5))} \cos\left(\frac{\pi}{2}(t - 0.5)\right) \\ y = \sqrt{\cos(\pi(t - 0.5))} \sin\left(\frac{\pi}{2}(t - 0.5)\right) \end{cases}, t \in [0, 1];$




(c)  $\begin{cases} x = \frac{2\pi}{5}t \cos(2\pi t) \\ y = \frac{2\pi}{5}t \sin(2\pi t) \end{cases}, t \in [0, 1];$



2. Repita o exercício anterior mas agora com polinómios quadráticos segmentados com 4 subintervalos.

3. Repita o exercício 1 mas agora com polinómios cúbicos de Hermite segmentados com 4 subintervalos.
4. Sejam  $(x_0, y_0) = (0, 0)$  e  $(x_1, y_1) = (5, 2)$  os extremos da curva. Use os seguintes pontos de guia para construir a curva de Ferguson-Coons ( $\lambda = 1$ ) que aproxima  $(x(t), y(t))$  :
  - (a)  $(1, 1); (6, 1)$ ;
  - (b)  $(0.5, 0.5); (5.5, 1.5)$ ;
  - (c)  $(1, 1); (6, 3)$ ;
  - (d)  $(2, 2); (7, 0)$ .
5. Repita o exercício anterior mas agora com curvas de Bézier.
6. Considere a carta dada na figura seguinte. Usando curvas de Bézier:



- (a) aproxime a estrada Cruz Alta - Buçaco desde o seu início até ao quarto entroncamento;
- (b) aproxime a curva de nível de 500m.